

11cm

بحتوى: بيرمترin (25:75 سيس: ترانس ايزومير) 1% مسحوق لإبادة الطفيليات الخارجية على الطيور البياضية. معالجه لمده واحده يبيد القمل، فش الريش، الفش الأحمر والفس على انواعه.

رخصة الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة رقم: 243
اقراء بتمعن لاصقة المستحضر قبل الاستعمال!

تحذيرات للإنسان: قد يؤدي الى حساسيه عاليه بالتلامس مع الجلد.
وسائل الوقاية والحماية: أثناء تنفيذ تعثير المستحضر ارتدي كفوف مصنوعه من نيوفرن (بحسب المعيار EN374/3) ، ملابس واقيه (التي تشمل ملابس عمل طويلة، حذاء عال وملحق) وكمامه وجه كامله (بحسب المعيار EV-136) مع مصفاه (بحسب المعيار EN14387 من نوع P3).
منع الاكل او الشرب او التدخين أثناء التغير.

وبانتهاء الاستعمال اغسل يديك وأجزاء الجسم المكشوفة جيداً بالماء والصابون. اغسل ملابس العمل بمعزلة عن الغسيل العام
مخاطر للبيئة: المستحضر سام للنحل، سام للأسماك والأحياء المائية وذو تأثيرات سلبية بعيدة المدى على البيئة المائية، ولذلك منع الاستعمال بالقرب من مصادر المياه.

تعليمات الاستعمال: امسك الطير، انتر المسحوق بآلية تغيير او باديي محميه بكوف على مكان تواجد الطفيليات. فتحة البراز وتحت اجنحة الطير بمقدار 10-15 غم مستحضر للطير، بحسب الافه وتبعاً للانحة الاستعمال.



مسحوق
لكافحة
الطفيليات الخارجية
على الطيور البياضية



4cm

4cm

نوع الطفيلي	مكان تواجد الطفيلي	المقدار	ملاحظات
الفش: فش الطيور	فتحة البراز عند الطيور	علاج واحد بمنطقة فتحة البراز.	
الشمالي والفس		طيور بياضه: 10 غم للطير	
الاستوائي			علاج واحد على جميع اجزاء الطير
فشل الريش			منطقة الجناحين
الفش الاحمر	في اليوم: في الايقاص		قبل ادخال فوج جديد يجب تغيير الايقاص
	المعدة للنفخ، حبران		بـ 10- غم للقصص فقط بعد تنفيذ الاجراءات
	المبني والأرضية		المدونة بالملحوظات
	في الليل: على الطير		
		يجب اعادة العلاج بعد 10-14 يوم	باجزاء الطير المختلفة
قبل	على الطير	10 غم للطير	طيرور بياضه : 10 غم للطير

فتره الانتظار قبل تسويق البيض: 24 ساعة بعد الاستعمال.

تخزين: يجب حزن المستحضر بعوته الاصلية بمكان مضلل، مقل، المعد للمبيدات، ولمنع وصول الاولاد والاشخاص غير مؤهلين لاستعمال المستحضر

التصريف بمستحضر سكب: اذا سكب المستحضر على التربة يجب جرف كل التربة الملوثة وجمعها بوعاء محكم، اذا سكب على مسطح مغلق: يجب تحويل المنطقة بمادة ماصة مثل: رمل، خاللة تجارة او اثواب امتصاص مخصص، (يجب امتصاص كل المسكوب بمواد الامتصاص والحفظ بوعاء محكم. الوعاء المحكم يجب ارساله الى موقع مرخص لاستيعاب مواد خطرة . منع شطف مستحضر سكب بالماء من اجل تخفيقه او ازالته).

التصريف بالعبوات الفارغة: مزر العبوة الفارغة ولها بكيس نايلون ولقى بها لسلة القمامه.

الإسعافات الأولية:

في حالة حدوث تماس الجلد: اشطف بالماء والصابون لمدة 10 دقيقة على الأقل. اذا لزم الأمر، توجه للعلاج الطبي.
في حالة تماس مع العينين: اشطف العينين فوراً بالماء لمدة 15 دقيقة على الأقل (العيون مفتوحة) وتوجه للعلاج الطبي.
في حالة البلع - امنع النسبه بالتقدير، إذا كان المصاب واعي اسفة الماء. وتوجه للعلاج الطبي في أقرب وقت ممكن. لا تنسى ماء لمصاب فقد الوعي.

في حالة الاستنشاق - اغسل المصاب من منطقة التعرض للإصابة الى مكان مهوا. اجلس/ مدد المصاب بحالة راحة. إذا كان المصاب يواجه صعوبة في التنفس، أجلسه منتصباً وإذا أمكن اعطه الاوكسجين. إذا كان المصاب فقداً للوعي، فخذ اعراضه وانقله للرعاية الطبية مباشرة.

معلومات اضافيه: مركز المعلومات القطري للتسمم المركز الطبي رمبام، حيفا، رقم هاتف: 04-7771900. في حالة شك بالتسنم يجب التوجه فوراً الى الطبيب مع لائحة المستحضر.

منع استعمال المستحضر بعد التاريخ الأخير للاستعمال الصاهر على العبوة

الخدمات البيطرية أقرت بأن استعمال المستحضر بما ينافي تعليمات اللائحة قد يعرض المستخدم، الحيوانات للخطر. خطير على صحة الجمهور والبيئة، وبعتبر مخالف للقانون.



3.5cm